

Kudzu

KUDZU TROPICAL - FICHA TECNICA

Nombre Científico	<i>Pueraria phaseoloides</i>
Origen	Perú
Tiempo de Vida	Leguminosa (Perenne)
Hábito de Crecimiento	Rastrero, Trepador, Voluble, Hojas grandes anchas
Producción de Materia Verde	56 Toneladas / Hectárea / Año
Condiciones Ideales de Suelo	Baja/Mediana fertilidad/Alta humedad/ De arenosos a arcillosos medios
Tolerancia / Resistencia	Alta a acidez, Precipitación, Encharcamiento, Inundación corta
Palatabilidad (Aceptación)	Buena a mediana para rumiantes
Densidad de Siembra	Alvoleo 4 a 6 Kg. de Semilla / Hectárea Pureza = 98 %; Geminación = 80 %
Tiempo de Establecimiento	180 días post emergencia
Temperatura / Precipitación	20 a 35 Grados C. / 1,200 a 4,000 mm / Año
Altitud	De 0 a 1,000 msnm. En Colombia hasta 2,000 metros

RECOMENDACIONES DE SIEMBRA Y MANEJO

Conservación de Semilla	Guardar a la sombra, sobre listones de madera en lugar fresco, ventilado y seco.
Escarificación para aumentar germinación} 15 – 20%	Sumergir la semilla en agua por 5 minutos a 60°C. Remojo en agua al clima por 24 horas previa siembra.
Profundidad	2 a 4 cm. máximo (Tapar. Apisonar en suelo franco o arenoso).
Distanciamiento	Manual : Entre Hileras 1 m. / Entre Golpes 50 cm. A Máquina: Hilera continua cada metro / 10 semillas por metro.
Deshierbo	Manual 1 o 2 veces hasta establecimiento.
Época de Siembra	En Selva una vez establecidas las lluvias/En costa en meses de calor.
Estado Ideal del Terreno	De ligera a mediana humedad.

